

# Bestimmungsschlüssel für ausgewählte Laubbäume und Sträucher im Winterzustand

Beim Bestimmen sollten immer mehrere Zweige betrachtet werden, da die typischen Merkmale nicht immer zutreffen.
















Teil · Del

# 2

## Ključ za določanje izbranih listopadnih dreves in grmov pozimi

Pri določanju primerjamo vedno več vej iste rastline, ker se lahko veje včasih med seboj razlikujejo.

Start



**Brsti ali popki?**  
Iz brstov se razvijejo (zeleni) listi. Iz cvetnih brstov oz. popkov se razvijejo cvetni listi različnih barv.

**Posebne prilagoditve brstov:**  
**lepljivost:** zunanja plast iz (lepljive) smole prepreči rast gliv ter prehranjevanje živali z brsti, ki so zelo hranljivi. Smola zmanjša tudi izhlapevanje vode, ki je drevo pozimi ne more pridobiti iz zmrznjenih tal.  
**dlakavost:** poraslost z dlačicami zmanjša izhlapevanje vode. Delno ščiti pred mrazom, vetrom in sončnimi žarki, ki jih dlačice odbijajo (reflektirajo).  
**rdečkasta barva:** brsti so pogosto rdečkaste barve; rdeči barvni pigmenti ščitijo listne zasnove v notranjosti brstov pred UV-žarki, ki bi lahko poškodovali celice in/ali dedno snov (DNK) v celičnih jedrih.